Land Salzburg

Für unser Land!

DER GEWÄSSERSCHUTZ

www.salzburg.gv.at/gewaesserschutz

Wiederbelebung der Fischwanderung im Potamal eines großen Alpenflusses, der Salzach

*Restoring fish migration in the potamal region of a large
alpine river, Salzach*

**Vortrag beim 5. Internat. Rheinsymposium
„Fischaufstieg und Fischabstieg“**

IKSR, 2. - 4.11.2005 Bonn

Dr. Paul Jäger

paul.jaeger@salzburg.gv.at

SALZBURG um 1825
Die ursprüngliche Salzach

SATTLER - PANORAMA

© Salzburger Museum Carolino Augusteum

Zur Entwicklung der Unteren Salzach Eisrandseen nach der ersten Phase des Gletscherrückzuges ~ 18.000 Jahre vor heute

Die Salzach entwickelte ihren pendelnden Lauf im
verfüllten Becken des nacheiszeitlichen Salzburger Sees.

Ein ausgedehnter Potamalbereich vom Inn bis zu den
Ausläufern der Kalkhochalpen entstand.

Das Furkationssystem der Salzach im Freilassingener Becken um 1817

Der pendelnde Lauf des Flusses war von hoher Umlagerungsdynamik, Altarmen, Nebengerinnen, von großen Schotterflächen und ausgedehnten Auwäldern geprägt.

Rot eingetragen die bereits 1817 geplante Regulierungsstrecke

**Detail aus dem Sattler Panorama 1825
Blick von der Festung nach Norden**

Die Untere Salzach vor der großen Korrektion

**Die regulierte Salzach mit
Saalachmündung heute**

**Derzeit akuter wasserbaulicher Handlungsbedarf
auf Grund der rasanten Sohleintiefung im
Freilassinger Becken –
die Chance für die ökologische Sanierung**

Ökologische Problembereiche

**Rhithralisierung des Flusses durch altes
Regulierungskonzept**

**Abtrennen der Nebengewässer
Absinken des Grundwasserstandes**

**Entkoppelung von Fluss und Aue, sukzessive
Veränderung der Auestandorte**

Beispiel

Kontinuumsunterbrechung durch Sohleintiefung

Die Mündungen der Nebengewässer werden durch die Eintiefung der Salzach immer steiler, die Fischpassierbarkeit leidet

Fischachmündung, Juli 2005

Foto: P. Jäger

EU-Wasserrahmenrichtlinie - erhält die europäische Gewässerlandschaft Zielzustand – der gute Zustand

Schutz des ursprünglichen Gewässertyps

- ◆ ***Erhaltung der natürlichen Beschaffenheit der Gewässer einschließlich ihrer hydromorphologischen Eigenschaften und der für den ökologischen Zustand maßgeblichen Uferbereiche***
- ◆ ***Erhaltung / Wiederherstellung des Gewässerkontinuums***
- ◆ ***Schutz der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren Wasserhaushalt – Erhalt der Auen***

Überwachung – die Gewässerorganismen werden befragt

- ◆ ***Physikalisch-chemische und biologische Qualitätskomponenten bestimmen den Zustand der Gewässer***
- ◆ ***Organismen sind Indikatoren für anthropogene Veränderungen, bes. Benthoszoenosen und Fische***

Referenzzustand wird Leitbild von Sanierungen

- ◆ ***Referenz und Leitbild ist der naturbelassene Fluss, z. B. die Salzach vor Beginn der großen Regulierungen ca. 1820***

Die ökologische Sanierung der Unteren Salzach

Was ist zu tun ?

- Erreichen des guten ökologischen Zustandes von Fluss und Aue
- Erhaltung und Entwicklung der Natura 2000-Schutzgebiete

Foto: P. Jäger

Österreichischer Bericht der IST-Bestandsaufnahme gemäß EU-WRRL Stand Dezember 2004

Herausgeber: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW), Sektion VII

GIS-Bearbeitung/Kartographie: umweltbundesamt

Risikoanalyse

Risikoanalyse der Oberflächenwasserkörper
in Hinblick auf eine mögliche Zielverfehlung -
Gesamtergebnis

- kein Risiko
- Risiko nicht einstuftbar
- Risiko

Die Sanierung der Unteren Salzach

Ökologischer Handlungsbedarf – guter ökologischer Zustand

◆ **Flusskontinuum**

- ◆ *ökologische Wiederanbindung der Salzach an die Donau*
- ◆ *Durchgängigkeit der Salzach und Saalach bis in die Forellenregion*
- ◆ *Durchgängigkeit der Mündungstrecken der Nebengewässer*

◆ **Salzach**

- ◆ *Sohlanhebung durch aufgelöste Rampen, fisch- und bootspassierbar*
- ◆ *Flussbettaufweitungen, weiche Ufer, pendelnder Flusslauf*
- ◆ *Rückbau längsparalleler Ufersicherungen*

◆ **Nebengewässer und Aue**

- ◆ *Anlage von Seitenarmen, strukturelle Verbesserungen in Nebengewässern*
- ◆ *Anhebung der Grundwasserstände im Auenbereich*
- ◆ *Erhöhung der Überflutungshäufigkeit gewässernaher Auenbereiche*

Flusskontinuum (1)

Fischfauna der Salzach

Fischartenspektrum

- ◆ **44 historische Fischarten wurden um 1900 in der Salzach nachgewiesen, als Langdistanz-Wanderfische der Hausen, Sterlet und Stör.**
- ◆ **Derzeit sind 35 Fischarten nachgewiesen, davon 26 der historischen Fischarten; die Langdistanz-Wanderfische sind derzeit verschollen. 9 Fischarten wie Sonnenbarsch, Aal, Stichling, Bachsaibling etc. sind Neozoa.**
- ◆ **Die Salzach ist für den Schutz des Huchens und der Koppe als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen.**

Fischartenvergleich Rhein - Donau

- ◆ **Die Langdistanz-Wanderfische unterscheiden sich stark, kein Lachs in der Donau.**
- ◆ **Die Zoenose der Flussfische in der Salzach entspricht in vielen Arten derjenigen des Rheins.**
- ◆ **Die in den Staustufen des Rheins am häufigsten aufgestiegenen Arten Barbe, Brachse, Nase, Rotauge, Laube, Hasel, Aitel, Bach- und Regenbogenforelle etc. finden sich auch in der Salzach.**

Literatur:

GERSTER (1998), JÄGER et al. (2001), JÄGER (2002), KLEIN (2001)

Flusskontinuum (2)

Das Wanderpotential der Fischfauna der Salzach

Fischaufstieg

- ◆ ***Der Vergleich der aufsteigenden Fischarten des Rheins mit den Fischarten der Salzach zeigt, dass mehr als 20 Fischarten funktionierende Fischpässe annehmen werden.***
- ◆ ***Orientierende Fischfänge unterhalb der Sohlstufe in Salzburg – Lehen belegen, dass dort 18 Fischarten anstehen, oberhalb wurden nur mehr 6 Fischarten gefangen.***
- ◆ ***Die Langdistanz-Wanderfische aus der Donau, Hausen, Sterlet und Stör, können auf Grund der Staustufen in Donau und Inn seit etwa 60 Jahren nicht mehr in die Salzach gelangen.***
- ◆ ***Die Wanderungen von Fischpopulationen aus der Donau zu Laichplätzen in der Salzach und ihren Nebengewässern bis oberhalb von Salzburg, belegt für Nase und Äsche, sind durch den Bau der Innstaustufen unterbrochen.***
- ◆ ***Mit dem Fischpass in Rott ist der Aufstieg in die Saalach seit Juni 2005 wieder möglich.***
- ◆ ***Die Sohlstufe in Salzburg – Lehen, das letzte Hindernis für den Fischzug in den Oberlauf der Salzach, soll im Zug der Salzachsanieung fischpassierbar werden.***

Flusskontinuum (3)

Das Wanderpotential der Fischfauna der Salzach

Fischabstieg

- ◆ ***wird über Staulegung der Kraftwerke bei Wasserführungen ab HQ 0,5 versucht***
- ◆ ***Spezielle technische Lösungen sind bei den Salzach-Staustufen oberhalb von Salzburg in Planung***

Derzeitiger Vorschlag:

***Fischscheuch- und Leitanlage vor Triebwassereinlauf,
Abziehen ankommender Fische durch abströmendes Wasser ($v > 2 \text{ m/s}$)***

Flusskontinuum

Fischaufstiegshindernisse von der Donau in Salzach und Saalach

Fischaufstiegshilfen Stand 2005 (wasserrechtlicher Bestand)

Sohlstufe Salzburg – Lehen 2005

*die letzte Fischbarriere am Weg zur
Forellenregion und
der Beginn des Sanierungsabschnittes
„Untere Salzach“*

Foto: P. Jäger

An aerial photograph of the Salzach river winding through a lush green landscape. The river is light blue and flows from the top left towards the bottom right. On the left bank, there is a dense forest. On the right bank, there are several buildings, including a large industrial or commercial complex, and a residential area with smaller houses. The river is flanked by green fields and trees. Two red arrows point to the riverbank on the left side, indicating the location of flood control measures.

Salzach

Maßnahmen des Wasserbaus (1)

**Sohlstabilisierung und Sohlhebung
durch aufgelöste flache Rampen**

fisch- und bootspassierbar

Foto: P. Jäger

Salzach

Maßnahmen des Wasserbaus (2)

Flussaufweitungen

natürliche weiche Ufer für verstärkte Seitenerosion

geschwungener Lauf, wandernde Kiesbänke

Das neue Flusskonzept

Foto: P. Jäger

Sanierungsvorschlag Ökologie 2002 Freilassinger Becken Untere Salzach

Nebengewässersystem und Aue

- Erhöhung der Überflutungshäufigkeit von gewässernahen Auebereichen
- Anlage von Seitenarmen Mittergraben und Kleine Salzach
- Aktivierung der Nebengewässer

**Der Reitbach als Rest der
Kleinen Salzach, einst ein stark
durchflutetes Nebengewässer -
wird wieder als rechter Nebenarm
aktiviert**

Foto: P. Jäger

Erste erfolgreiche Sanierungsschritte

◆ Bereits umgesetzt

- ◆ *Fischaufstieg an der Saalachmündung, KW Rott*
- ◆ *Fischaufstiege an der Salzach*
- ◆ *Fischabstieg wird über die Staulegung der Kraftwerke bei Wasserführungen ab HQ 0,5 versucht, weitere technische Maßnahmen in Planung*
- ◆ *Wiederöffnung und Dotation des Mittergrabensystems*

Das Tor zur Saalach

KW Rott
Fischpass 24.06.2005
Foto P. Jäger

Ausstieg in das Oberwasser

KW Rott
Fischpass 24.06.2005
Foto P. Jäger

**Wiederöffnung des Mittergrabensystems 2005
als linker Seitenarm von Saalach und Salzach**

Foto: P. Wenger

Der neue Fluss

Baubeginn vorgesehen ab 2006

Umsetzung der ökologischen Maßnahmen bis 2015

**Gesamte Entwicklungszeit für den Fluss -
einige Jahrzehnte**

**Die Salzachschleife
Oberndorf – Laufen**

Foto: P. Jäger

Erinnerungen an die Zukunft

„Die Aue lebt wieder“

Literatur:

BMLFUW (2004): Österreichischer Bericht der IST.-Bestandsaufnahme gemäß EU-WRRL
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien

GERSTER, ST. (1998): Hochrhein: Aufstiegskontrollen 1995/96; Vergleich mit früheren Erhebungen. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Mitt. Zur Fischerei Nr. 54, pp. 191

IBETSBERGER; H., DUMFARTH, E., HÄUPL, M., JÄGER, P, (2005): Die nacheiszeitliche Entwicklung des Salzburger Gewässersystems. Reihe Gewässerschutz, Amt der Salzburger Landesregierung, in Vorbereitung

JÄGER P., FUCHS, M., JÜRGING, P. (2001): Wasserwirtschaftliche Rahmenuntersuchung Salzach. Grundlagen, Methoden und Anwendung der ökologischen und naturschutzfachlichen Bewertung, pp. 101, München, Wien

JÄGER, P. (2002): Salzburger Fischpassfibel, Reihe Gewässerschutz, Band 1, 2. Auflage, pp. 152, Amt der Salzburger Landesregierung

KLEIN, J.-J. (2001): Der neue Fischpass Iffezheim, Ergebnisse der Überwachung der Fischaufstiege im ersten Berichtsjahr. Vortrag beim Intern. Symposium Fischpässe, „Weg frei für Wanderfische“, IKSR, Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !